

Fuente: IV JORNADAS TÉCNICAS DE LA FACULTAD DE VETERINARIA

- Cien años de los estudios Veterinarios en el Uruguay 1903-2003 -

ANÁLISIS DE COSTOS RELEVANTES DE DIFERENTES ALTERNATIVAS EN LA RECRÍA-ENGORDE DE CERDOS. Gómez, A. J.¹; Lopardo, J. P.¹; Barlocco, N.²; Vadell, A.²; Roman, J.¹

ecoyad@fvet.edu.uy

El trabajo busca aportar información sobre costos de sistemas de producción minimizadores de alimentos concentrados en recría-terminación de cerdos.

El experimento se desarrolló en el 2001 con 48 machos castrados, distribuidos aleatoriamente en 4 tratamientos. Se evaluó desde 43.77 ± 4.24 a 107.35 ± 6.45 kilos de peso vivo. La genética para el tratamiento 1, 2 y 3 (T1, T2 y T3 respectivamente) fue Híbridos Duroc x Pampa (HDP), para el tratamiento 4 (T4) Pampa. T1 se desarrolló en bretes confinados, los restantes en refugios sobre pasturas, con distintos niveles de restricción en concentrados. Los parámetros productivos son: consumo total de concentrado (kilos) 211.23a, 239.33b, 189ab, 221.33ab para T1, T2, T3, T4 respectivamente ($p=0.008$). La duración (días) fue 74, 84, 82, 91 para cada tratamiento respectivamente (n.s.). Se calculó **costo de alimentación y otros costos que diferencian los sistemas**. Los costos de alimentación (U\$S) por animal son 50.7, 58.0, 45.91, 53.73 para T1, T2, T3 y T4 respectivamente. T3 es el de menos costo, seguido por T1 y T4 (10.5 y 17% mayor que T3, respectivamente). Sumados los costos relevantes resulta para T1, T2, T3 y T4, en (U\$S) **por kilo**: 0.51, 0.56, 0.45, 0.53, respectivamente. El costo de alimentación representó el 93 y 96.3% del total para T1 y T2 y 95.5% en T3 y T4. **CONCLUSIONES:** 1) Se constata la viabilidad económica de incorporar pasturas en recría-terminación con restricción moderada de concentrado. 2) La utilización de pasturas en esta etapa para Híbridos Duroc x Pampa disminuye los costos de alimentación. 3) Se confirma la importancia del concentrado en los costos de producción.